

Lane Medical Lib
Aus der Universitätsklinik
für Nerven- und Geisteskrankheiten zu Halle (Saale)
Direktor: Professor Dr. Hauptmann

Ein Fall von Krampf der Unterkieferöffner bei Encephalitis epidemica

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der medizinischen Doktorwürde

der Hohen Medizinischen Fakultät der Vereinigten
Friedrichs-Universitäten Halle-Wittenberg

vorgelegt von

Sara Awramowa

aus Stara-Zagora (Bulgarien)

Berichterstatter:
Professor Dr. Hauptmann



Halle (Saale)
Schlesingersche Buchdruckerei
1928

Meinen lieben Brüdern
aus Dankbarkeit gewidmet.

Ein Fall von Krampf der Unterkiefer- öffner bei Encephalitis epidemica.

Die enorme Literatur, die in einer Zeitspanne von 6 bis 7 Jahren über Encephalitis epidemica entstanden ist, zeigt mit aller Deutlichkeit die unzähligen Formen und Variationen, in welchem diese Krankheit auftritt.

Eine der häufigsten Formen ist die als Parkinsonismus bezeichnete hypokinetisch-hypertonische, charakterisiert durch Armut der Mimik und unwillkürliche Bewegungen und eine Erschwerung und Armut der willkürlichen Bewegungen. Typisch für Parkinsonismus ist die nach vorn gebeugte Rumpfhaltung.

Im Gegensatz zum Parkinsonismus steht die hyperkinetische Form der Encephalitis, bei der wir den Reichtum an Bewegungen aller Art (choreatische, myoklonische, athetotische, rhythmische usw.) im Vordergrund stehen sehen. Je nach der Art der Hyperkinesen unterscheidet man auch eine Encephalitis choreatika, athetotika, myoklonika, convulsiva hemiplegika usw. (**P. Marie et Lewy, Barre, Reys, Bing, Mayer, Mayer und Kramb, Pette, Sainton, Sterz, Foerster** usw.) Gemeinsam für die beiden Formen von Encephalitis ist, daß sie sozusagen den ganzen Körper befallen. Die choreatischen Bewegungen z. B. treten wahllos in den verschiedensten Muskeln und Muskelgebieten, bald als komplizierte Bewegungen, bald als Einzelbewegungen auf. Bald wird nur ein Körperteil ergriffen, bald treten sie in mehreren gleichzeitig auf usw. Von diesen beiden Hauptgruppen der Encephalitis ist diejenige Form zu trennen, bei der nur eine bestimmte Gruppe von Muskeln der Krankheit anheimfällt. Neben den allgemeinen Krankheitserscheinungen, die an eine Encephalitis epidemica denken lassen, beherrschen diese Bewegungsstörungen in einem Muskelgebiet das ganze Krankheitsbild. Solche isolierten Bewegungsanomalien bei E. e. sind nicht allzu häufig. Befallen werden am meisten die Augenmuskeln. Bekannt sind die sogen. „Schaukrämpfe“ bei E. e. Die Augen werden plötzlich krampfhaft nach einer bestimmten Richtung verdreht, verharren

in dieser Stellung sekundenlang, dann kehren sie wieder zur normalen Lage zurück.

Der Krampf wiederholt sich beliebig oft. Bei manchen Fällen wird dieser Krampf von entsprechender Kopfbewegung begleitet.

Tonische Krämpfe der Augenmuskeln bei E. e. sind von **Dupuis Dufemps, B. S. Beyling, Lemos** usw. beschrieben worden. Nina Popowa berichtet über fünf Fälle aus der Charkow Nerverklinik mit ausgesprochenen tonischen Krämpfen der Augenmuskeln. Alle fünf Patienten hatten vor Jahren eine akute Encephalitis durchgemacht. In dreien von diesen Fällen bestehen tonische Krämpfe der oberen, unteren, seitlichen Augenmuskeln, die den Bulbus in bestimmter Richtung fixieren. Meistens aber ergreifen die Krämpfe die Muskeln, welche den Augapfel nach oben bewegen. In allen fünf Fällen hören die Krämpfe mit dem Schlaf auf. Eine Tatsache, die der Verfasserin den Anlaß gibt, das Schlafzentrum und die motorischen Apparate, die die Krämpfe auslösen, im System des Corpus Striatum unterzubringen. Neben den tonischen Krämpfen der Augenmuskeln sind bei allen fünf Patienten die charakteristischen Erscheinungen des Parkinsonismus vorhanden.

Einen analogen Fall mit isoliertem Krampf einer Muskelgruppe beobachteten wir in hiesiger Klinik für Geistes- und Nervenkrankheiten, der wegen der seltenen Lokalisation des Krampfes am Unterkiefer besonders interessant scheint. Es handelt sich um ein Mädchen, bei dem sechs Jahre nach einer akuten Encephalitis Krampfparoxysmen in der Kiefer- und Kaumuskulatur auftraten. Die Anamnese ergab:

Margarete Bach, 20 Jahre, Lehrerstochter. In der Familie ist nichts von Geistes- oder Nervenleiden bekannt, keine Tuberkulose, keine Trunksucht, keine Epilepsie. Mutter an einer Erkältungskrankheit im Alter von 38 Jahren gestorben, zwei richtige Geschwister, und zwei Stiefgeschwister sind gesund. Patientin wurde als ältestes Kind normal geboren. Kindliche Entwicklung ebenfalls normal. Vertrug sich gut mit den Geschwistern und anderen Kindern. Sonderte sich nicht ab. Besuchte anfangs die Dorfschule, dann eine Mittelschule, lernte sehr gut.

Mit 3 oder 4 Jahren Masern, im Anschluß daran war Patientin teilnahmslos, hatte etwa 8 Tage lang starkes Schlafbedürfnis. Dann war sie wieder frisch und munter; keine weiteren Folgeerscheinungen. Mit 14 Jahren kurz vor Eintritt der Periode, hatte Patientin über starkes Schlafbedürfnis, Kopfschmerzen, Appetitlosigkeit, verbunden mit Erbrechen, zu klagen. Sie habe

etwa 4 Wochen fast immer geschlafen, mußte zum Essen geweckt werden, bekam meist Kognak mit Ei, was sie aber auch erbrach. Ob sie damals Fieber gehabt hat, kann Patientin nicht angeben. Nach 4 Wochen trat die erste Regel ein; der Zustand besserte sich langsam. Patientin fühlte sich matt, schlief aber nicht mehr so viel. Nach etwa einem Monat war sie wieder ganz munter.

Sie erlernte den Haushalt bei Verwandten etwa zwei Jahre lang. Dann besuchte sie die Handelsschule 1 bis 1½ Jahre, war dann als Bürogehilfin tätig und konnte als solche alle verlangte Arbeit gut leisten.

Februar 1924 bemerkte Patientin Schwäche im linken Bein. Daselbe ermüdete sehr leicht. Es wurde beim Gehen nach außen geschleudert. Patientin fühlte Schwäche und Steifigkeit in der ganzen linken Seite. Dazu gesellte sich nach einigen Wochen Zittern in der rechten Hand. Etwas später stellte sich auch im linken Bein Zittern ein. Vor 2—3 Monaten, etwa Mitte September 1926, bemerkte Patientin, daß sie sehr schlecht kauen konnte. Nach einiger Zeit kamen hinzu zeitweise auftretende krampfartige Zustände in den Unterkiefern und der Kaumuskulatur. Der Mund wurde ruckartig geöffnet, konnte sekundenlang nicht geschlossen werden. Es zog sich ein krampfartiges Gefühl nach der linken Halsseite herunter, dann konnte der Mund mit Mühe wieder geschlossen werden. Auch die Zunge wird bei diesem Krampfstzustand ruckartig vorgestreckt, dabei treten Schmerzen in den Halsmuskeln, am Kiefer, in der Schläfengegend und am Hinterkopf auf. Diese Zustände wiederholten sich alle Viertelstunde, besonders bei Aufregungen. Auch die Sprache ist erschwert, nach Nachtruhe ist sie angeblich besser.

Außer den oben beschriebenen Zuständen klagt Patientin über allgemeine Mattigkeit, Kopfschmerzen, Schwäche in der ganzen linken Körperseite, besonders im Arm und Bein, Zittern in beiden Händen. Patientin ist sehr leicht erregbar, jedoch besteht keine besondere Reizbarkeit, auch keine Neigung zum Weinen. Schlaf ist befriedigend, Stuhlgang und Wasserlassen in Ordnung. Patientin war in ärztlicher Behandlung bei einem praktischen Arzt, der Patientin nach der Klinik überwies, und zwar wegen Nervenlähmung.

Status praesens.

Zwanzigjähriges infantiles Mädchen von grazilem Körperbau in mäßigem Ernährungszustand, Gewicht 39,5 kg bei einer Größe von 143 cm. Haltung vorn über gebeugt, Bewegungen verlangsamte. Der Muskeltonus

ist ziemlich straff. Haut und sichtbare Schleimhäute mangelhaft durchblutet. Deutlicher Dermographismus. Hände und Füße meist feucht. Starke Schweißabsonderung in den Achselhöhlen, Neigung zum Nachtschweißen.

Kopfumfang 52, Querbogen 33, Längsbogen 28,5. Der Schädel ist brachiocephal, das Hinterhaupt von geringerem Volumen. Keine Klopf- und Druckempfindlichkeit. Das Gesicht zeigt bei aller Lebhaftigkeit der Patientin während des Sprechens im Ruhezustand doch eine gewisse mimische Starre; Andeutung von Salbengesicht. Augenbewegungen sind frei nach allen Richtungen; beim Sehen in die Nähe geht der Bulbus nicht ganz bis zur Innenstellung mit. Kein Nyktismus, kein Doppelsehen. Bindehautreflex rechts herabgeleßt, links fast normal. Pupillen mittelweit, beiderseits entrundet, reagieren prompt und ziemlich ausgiebig auf Licht und Convergenz, Augenhintergrund O. B.

Es besteht eine linksseitige Facialisparese, die sich durch Hängen des linken Mundwinkels, ein Zurückbleiben der linken Seite beim Stirnrunzeln, sowie bei Hochziehen der Brauen äußert. Bei Ruhe, sowie beim Sprechen wird der Mund zwangsweise aufgerissen und es bereitet der Patientin offensichtlich Mühe, ihn wieder zu schließen. Gleichzeitig wird häufig die Zunge vorgestreckt und Patientin macht krampfartige Anstrengungen, um die Zunge zurückzuziehen und den Mund zu schließen und ist oft genötigt, hierbei die Hand zur Hilfe zu nehmen. Sie gibt an, häufig Spannung (früher Schmerz) im Kiefergelenk beim Mundaufreißen zu empfinden.

Aufgefordert, den Mund zu schließen, hilft Patientin mit der Hand nach, indem sie den Unterkiefer kräftig mit der Hand gegen den Oberkiefer preßt. Ohne Unterstützung der Hand öffnet sich der Mund zwangsweise und der Unterkiefer gerät in spastisches Zittern. (Wie lange der Mund in dieser Stellung verharren kann, ist schwer zu beurteilen, da die Patientin wegen der Spannung und der Schmerzen, die das Weitaufreißen des Mundes ihr verursachen, den Mund sofort zu schließen versucht). Der Untersuchende stößt beim Versuch, den Mund zu schließen, auf großen Widerstand und fühlt die stark gespannten Muskeln unter dem Unterkiefer. Das Öffnen des Mundes auf Geheiß erfolgt blösig, ohne der Patientin Mühe zu verursachen.

Um diesem Weitaufreißen des Mundes entgegenzuwirken, hilft sich Patientin, indem sie kräftig auf die Unterlippe oder auf ein Taschentuch beißt. Beim Essen wird der Mund ebenfalls weit geöffnet, aber das Kauen ist nicht besonders erschwert. Der Mund wird während

des Kauens leichter geschlossen, ohne daß die Patientin genötigt ist, die Hand dabei zur Hilfe zu nehmen.

Im Schlaf und im Liegen bleibt der Mund geschlossen. Mundspitzen, Pfeifen, Blasen ist nicht möglich. Patientin gähnt ab und zu und reißt dabei den Mund besonders weit auf.

Die Sprache zeigt einen nasal-bulbären Charakter. Gebiß etwas defekt. Die Zunge ist an der Seite stark gefurcht, zeigt in der Mitte eine kleine Rinne, sie ist nicht belegt, wird gerade aber zitternd vorgestreckt. Würgereflex deutlich vorhanden. Keine Schluckbeschwerden. Gehör, Geruch und Geschmack sind intakt. Milz eben fühlbar. Innere Organe O. B.

Obere Extremitäten:

Keine Spannungsabmagerungszustände. Keine Lähmungsercheinungen. Hände auffallend klein, infantil. Händedruck mäßig kräftig, beiderseits gleich. Beim Spreizen der Finger mit vorgestreckten Armen deutlicher Tremor, besonders rechts. Keine Ataxie. Sehnenreflexe gesteigert.

Untere Extremitäten:

Zeigen mäßige Spasmen, besonders rechts bei passiver Bewegung geringen Widerstand. Grobe Kraft beiderseits sehr gut. Leichtes Schwanken beim Heben der Beine von der Unterlage, aber keine Ataxie. Knie-sehnenreflexe gesteigert beiderseits gleich. Babinski negativ. Kein Fußklonus. Füße klein, infantil. Sensibilität für alle Qualitäten intakt.

Gang. Das linke Bein wird beim Gehen etwas nach außen gesetzt, so daß das Bein zuweilen besonders auch beim plötzlichen Umkehren etwas unsicherer als das rechte erscheint.

Beim Stehen mit Fuß-Augenschluß deutliche Fallneigung nach hinten. Patientin gibt an, daß sie beim Kämmen leicht nach hinten überfällt.

Psychisch ist die Patientin ruhig, geordnet, gibt prompt und willig Auskunft, redet auch bei der Untersuchung öfter dazwischen, zeigt große Neugierde, ist im ganzen etwas euphorisch eingestellt, besonders in Bezug auf ihre Leiden. Intelligenz und Kenntnisse zeigen keine gröberen Störungen. Gedächtnis, Merkfähigkeit und Urteilskraft gut erhalten.

Verlauf.

20. November 1926. Patientin hat sich hier gut eingewöhnt, ist aber oft sehr unruhig und läuft viel herum. Darauf aufmerksam gemacht, daß sie die Bewegungsfreiheit der Glieder stets gut in Gang erhalten müsse, macht sie, da sie es auch früher schon getan hat, morgens und abends Freiübungen, fordert die anderen Encephalitiker auf, das gleiche zu tun.

22. November. Patientin klagt über Brechreiz und Kopfschmerzen. Da sie Beschwerden beim Kauen hat, erhält sie breiige Speisen und viel Flüssigkeiten. Tagsüber beißt sie, um dem Kieferkrampf entgegenzuwirken, auf ein Taschentuch, was ihr eine Erleichterung ist, da der Mund dann angeblich mehr geschlossen bleibt. Erhielt eine Pregl'sche Lösung. Wassermann'sche Reaktion im Blut negativ.
28. November. Patientin erhielt gestern die erste Saprovitän-Injektion, hat eine Fieberreaktion bis zu 38,4, klagt über große Schläffheit und Müdigkeit.
5. Dezember. Patientin bekommt heute Saprovitän-Injektion, hat Temperatur bis zu 39,1, klagt über Kopfschmerzen.
11. Dezember. Saprovitän-Injektion. Temperatursteigerung bis 38,8, klagt über Kopfschmerzen, fühlt sich aber nach Abklingen der Reaktion ebenso wie die letzten beiden Male erheblich wohler, behauptet, daß der Unterkieferkrampf auch jetzt noch ebenso häufig aufträte, daß der Mund aber jetzt dabei nicht mehr ganz soweit aufgerissen würde wie zuerst, und daß der Krampf ihr nicht mehr viel Schmerzen bereite.
16. Dezember. Nach der gestrigen Saprovitän-Injektion reagiert Patientin ebenfalls mit einer Temperatursteigerung bis 39,1.
26. Dezember. Patientin sieht blaß aus, obwohl entschieden eine geringe Besserung eingetreten ist; ist in ihrem Wesen ruhiger geworden, obwohl sie noch immer eine Tendenz zur Einmischung in fremde Angelegenheiten, in den Wunsch, in ihrer Behandlung bevorzugt zu werden, zeigt.
28. Dezember. Patientin war vom 23. bis 27. nach Hause beurlaubt. Der Weihnachtsurlaub ist ihr gut bekommen. Sie erhält heute Saprovitän-Injektion. Die höchste Temperatur betrug 38,8. Sie hatte wieder Schüttelfrost, fühlte sich danach sehr angegriffen.
4. Januar 1927. Erhielt heute wieder Saprovitän-Injektion. Die Temperatur stieg auf 37,9.
9. Januar. Trotz geringer Gewichtsabnahme hat der allgemeine Zustand sich bisher entschieden gebessert. Der Kieferkrampf hat sowohl an Stärke als auch an Schmerzhaftigkeit eingebüßt und tritt auch nicht mehr so häufig auf wie früher. Der Mund wird nicht mehr soweit aufgerissen. Patientin gibt an, daß der Krampf jedesmal am Tage der Saprovitän-Injektion zunimmt, um in den folgenden Tagen um so stärker zurückzugehen. Auch psychisch ist Patientin etwas ruhiger und gleichmäßiger geworden.
22. Januar. Während dieser Zeit hat Patientin Saprovitän-Injektionen bekommen. Temperatur stieg auf 37–38,8.
1. Februar. Die Patientin hat in der letzten Zeit noch drei Saprovitän-Injektionen bekommen. Die Temperaturen betrugen bis 39,6. Das Allgemeinbefinden war bei den letzten Injektionen schon ziemlich schlecht. Vor allem war der Puls auffallend klein. Die Patientin klagte über Herzschmerzen. Es wurde Digitalin verordnet. Außerdem klagt sie während des Fiebers über Gliederschmerzen.

Im ganzen ist subjektiv und objektiv eine Besserung des Zustandes feststellbar. Der Kieferkrampf tritt weniger kräftig auf, auch die bei dem Krampf auftretenden Schmerzen im Kiefergelenk sind geringer geworden. Patientin ist hinsichtlich ihrer Krankheit sehr optimistisch eingestellt.

10. Februar. Die Patientin weigert sich, die letzten Saprovitän-Injektionen machen zu lassen, weil sie es nicht mehr ertragen kann, da sie auch stets einen sehr schlechten Puls aufwies, wird davon abgesehen.

Die Gesichtsfarbe der Kranken ist immer noch ziemlich blaß und der Appetit trotz Condurango mangelhaft. Sie äußert keine Klagen, ist im Wesen freundlich, aber immer etwas neugierig und stark interessiert über den Verlauf ihrer Krankheit.

Der objektive Befund ist wenig verändert; bei Aufregungen und lebhaften Schrecken macht sich der Kieferkrampf noch in geringem Maße bemerkbar.

Ein Zittern der Extremitäten ist nicht festzustellen. Die Patientin hat in der letzten Zeit noch zwei Injektionen Pregl'sche Jodlösung bekommen, die ihr aber angeblich nicht bekommen sind. Die Kieferbeschwerden sollen danach stärker und ihr Allgemeinzustand schlechter geworden sein. Patientin dringt jetzt schon öfter auf ihre Entlassung, da sie meint, daß die Ruhe zu Hause ihr eine endgültige Besserung bringen wird.

26. Februar. Vor einigen Tagen klagte Patientin plötzlich über Schwäche und Beschwerden im linken Bein, so daß sie leicht ermüdet. Sie schilderte, daß sie zu Beginn ihrer Krankheit diese Empfindungen schon einmal gehabt habe. Nach einem Tage waren die Beschwerden wieder vorüber.

Neurologische Nachuntersuchung.

26. Februar 1927. Haltung etwas nach vorn gebeugt, Bewegungen etwas verlangsamt. Kein Unterschied in der Weite der Lidspalten, eine geringe linksseitige Fazialisparese ist noch nachweisbar. Die linke Seite bleibt beim Stirnrunzeln und beim Hochziehen der Augenbrauen etwas zurück.

Manchmal bleibt beim Sprechen der Mund der Patientin noch etwas geöffnet, die Zunge wird dabei nicht vorgestreckt. Ein Schmerz im Kiefergelenk und der seitlichen Halsmuskulatur, wie er bei der Patientin früher auftrat, ist jetzt nicht mehr vorhanden. Patientin führt bei diesem Zustande öfter zwangsweise die Hand an den Mund, was sie früher tun mußte, um den Mund schließen zu können. Die Pupillen sind beiderseits entrundet, mittelweit, reagieren auf Licht und Konvergenz genügend. Augenbewegungen frei nach allen Richtungen. Beim Sehen in die Nähe gehen beide Bulbi nicht ganz bis zur Innenstellung mit.

Conjunktival- und Conealreflex beiderseits positiv. Würgreflex vorhanden. Zunge wird gerade herausgestreckt, zittert leicht. An den Armen Muskeltonus, grobe Kraft gut und gleich, Reflexe beiderseits gleichmäßig gesteigert. Bauchdeckenreflex links lebhafter als rechts. In den Beinen sind keine sicheren Spasmen mehr nachweisbar. Partellarreflexe beiderseits gesteigert. Achillessehnenreflexe ebenfalls sehr lebhaft. Keine Kloni, Oberflächenfunktionsfähigkeit intakt. Keine Ataxie beim Fingernaseversuch. Beim Kniehakenversuch Schwanken besonders links. Der Gang zeigt keine Störungen. Romberg negativ.

Epikrise.

Ein 20 jähriges Mädchen erkrankt im Jahre 1920 mit den für Encephalitis epidemica charakteristischen Initialsymptomen: Kopfschmerzen, Erbrechen, Appetitlosigkeit, allgemeine Mattigkeit und großes Schlafbedürfnis. Sie schläft darauf einen Monat fortwährend, wird nur zum Essen geweckt, erbricht alles, was sie zu sich nimmt. Während der ganzen Krankheitsdauer aber sind keine größeren Augenstörungen, wie mangelhafte Innervation der Augenmuskeln, Ophthalmoplegien, Akkomodationsstörungen, Pupillenstörungen usw., die man nach neueren Statistiken in etwa 60 bis 80 % bei Encephalitis epidemica beobachtet, nachweisbar. Man vermißt hier auch jegliche Jaktationen, Hyperkinesen, motorische Unruhe, auch eine sehr häufige Begleiterscheinung der Encephalitis epidemica. Auch nach der Erkrankung sind bei der Patientin keine größeren Residuen einer Encephalitis nachweisbar. Sie konnte später alle verlangte Arbeit gut leisten. Erst vier Jahre nach der Erkrankung fühlt Patientin Schwäche im linken Bein, vergesellschaftet mit Steifigkeit und Mattigkeit. Das linke Bein wird beim Gehen nach außen geschleudert. Kurz danach setzen Schwäche und Zittern in beiden Händen ein. Das Zittern oder der Tremor bei Ruhe und Bewegung wird fast regelmäßig besonders bei den amyostatischen Postencephalitikern beobachtet. Der Tremor ist in solchen Fällen als Pseudospontanbewegung anzusehen.

Zwei Jahre nach den oben geschilderten Erscheinungen bezw. sechs Jahre nach der Erkrankung kann Patientin plötzlich sehr schlecht kauen. Dem schlechten Kauen folgt nicht lange danach ein Krampf der Unterkieferöffner. Der Mund wird zwangsweise weit aufgerissen. Die Unterkieferöffner geraten in tonischen Krampf, verharren in dieser Stellung sekundenlang, dann wird der Unterkiefer mit größter Mühe geschlossen, indem die Patientin die Hand zur Hilfe nehmen muß. Dieser Krampf der Unterkieferöffner, den wir bei unserer Patientin sehen, ist das Interessante dieses Falles, denn nach den Literaturberichten ist bis jetzt kein Fall von Unterkieferkrampf bei Encephalitis beobachtet worden. Er ist wohl dem isolierten Krampf der Augenmuskeln gleichzustellen.

Der Krampf hat sich Jahre lang nach dem akuten Stadium der durchgemachten Encephalitis eingestellt und hängt mit ihr zusammen. Unser Fall wäre in dieser Hinsicht als einer von den vielen sogen. Postencephalitikern zu betrachten. Das postencephalitische Stadium ist in seinen Ausdrucksformen ebenso reich und mannigfaltig wie die Encephalitis acuta.

Heute, nachdem die großen Epidemien von 1920 und 1921 schon längst hinter uns liegen, sind die Postencephalitiker der schreckliche Beweis dafür, daß die Encephalitis epidemica sehr quälende und unheilbare Residuen hinterläßt. Diese Formen der Spätencephalitis haben einen besonders torpiden Verlauf und sehr schlechte Prognose, inbezug auf eine vollkommene Heilung. Was aber bei unserem Fall das Eigentümliche ist, ist nicht so sehr das Auftreten des Krampfes im Stadium der Postencephalitis, sondern die Lokalisation des Krampfes.

Im akuten Stadium werden sehr oft Kau- und Schluckstörungen beobachtet. Am häufigsten äußert sich die Erkrankung der Kaumuskulatur in Form eines Trismus, in einer beschränkten Oeffnungsmöglichkeit des Unterkiefers, so wie wir ihn auch z. B. beim Tetanus, Meningitis, Apoplexie usw. beobachten.

Der Trismus bei Encephalitis ist offenbar auf einen hochgradig gesteigerten Tonus der Kaumuskulatur zurückzuführen, was zu einer Beschränkung der Mundbewegungen führt, insofern der Mund nicht über eine Breite von 2 bis 3 cm geöffnet werden kann (Pierre Marie u. Lewy).

Wenn der hochgradig gesteigerte Tonus der Kaumuskulatur einen Trismus erzeugt, so müssen wir bei unserer Patientin im Gegenteil eine Schwäche der Kaumuskulatur und einen gesteigerten Tonus der oberen Zungenmuskeln, die den Unterkiefer nach unten ziehen, annehmen.

Normalerweise, d. h. physiologischerweise, wird der Unterkiefer nach den neuesten Anschauungen der Physiologen zuerst ohne besondere Muskelwirkung seiner Schwere nach gelenkt, dann treten aber die Musculi Mylo- und Genio-hyoidei und die vorderen Bänder des Digastrikus ein. Beim starken Aufreißen des Mundes treten die Gelenkköpfchen des Unterkiefers nach vorn. Seitlich wird der Unterkiefer durch die einseitige Tätigkeit des M. Pterygoideus internus, vorwärts durch die gemeinsame Tätigkeit der M. Pterygoidei externi bewegt. (Abderhalden, Lehrbuch der Physiologie, I. Teil).

Die gemeinsame Tätigkeit der Masseteren, des Temporalis und der Pterygoidei interni bewirkt den Kieberschluß.

„Bei einseitiger Kaumuskellähmung können die Kranken nur auf der gesunden Seite kauen; bei Kiefer-schluß fühlt und sieht man nur auf dieser Seite die Muskelkontraktion. Beim Oeffnen des Mundes weicht der Unterkiefer nach der gelähmten Seite ab, indem der Pterygoideus externus den Prozeßus condyloideus nur auf der gesunden Seite nach vorn zieht.

Bei doppelseitiger Lähmung der Kaumuskulatur fehlt der Kieferschluß gänzlich, bei der Parese ist er schwach, kann durch den Untersuchenden mehr oder weniger leicht überwunden werden.“ (Oppenheim, Lehrb. der Nervenkrankheiten, I. Band S. 103).

Verforgt werden die Kaumuskeln einschließlich des vorderen Bauches des Digastrikus und des M. Mylohyoideus vom dritten, motorischen Ast des N. Trigeminus, während der M. geniohyoideus vom N. Hypoglossus und der hintere Bauch des Digastrikus vom N. Digastrikus (ein Ast des N. Facialis) versorgt werden.

Der N. Hypoglossus versorgt die gesamte Zungenmuskulatur, welche die Zungenbewegungen bewirkt. Und zwar wird die Zunge durch die gemeinsame Tätigkeit der M. Genioglossi vorwärts gestreckt. Die M. hyoglossi ziehen die Zunge rückwärts.

Die einseitige Kontraktion des M. genioglossus bewirkt eine Verschiebung der Zunge nach der entgegengesetzten Seite. Bei Lähmungszuständen weicht die hervorgestreckte Zunge nach der gelähmten Seite ab.

Was liegt nun bei unserer Patientin vor?

Eine doppelseitige Lähmung der Kaumuskeln mit fehlendem Kieferschluß im Sinne Oppenheims ist nicht anzunehmen; denn die Patientin schließt während des Kauaktes, wenn auch mit gewisser Mühe, den Mund zu, also ein Kieferschluß ist da.

Auch eine Parese der Masseteren und Temporalis ist nicht sehr wahrscheinlich: Patientin kann kräftig auf die Unterlippe oder auf ein Taschentuch beißen, was gegen eine Parese spricht.

Für die Erklärung des Krampfes der Unterkieferöffner bestehen zwei Möglichkeiten:

1. Es handelt sich um einen primären Krampf der Unterkieferöffner.
2. Der Krampf ist nur der Ausdruck einer „paradoxen Kontraktur“.

Für die erste Annahme wäre an sich eine Parese oder ein normales Erschlaffen der Kaumuskeln keine Vorbedingung. Nahegelegt wird dieser Moment nur durch die Ansicht der Anatomen, daß die Muskulatur der Unterkieferöffner zu schwach sei, um entgegen dem Tonus der Kaumuskulatur eine Oeffnung des Mundes zu

erzielen. Wo aber ein Muskel=Crampuß in seiner Wirkung weit über das Ausmaß einer normalen Muskelkontraktion hinausgeht, so wird man bei Zugrundelegung der ersten Annahme wohl auch ohne die Mitwirkung einer Minusleistung seitens der Kaumuskulatur auskommen.

Die zweite Annahme setzt ein Heruntersinken des Unterkiefers voraus, was eine Annäherung der Insertionspunkte der Kieferöffner zur Folge hat, und damit, nämlich beim Vorliegen einer veränderten Muskeldynamik eine „paradoxe Kontraktur“, wie sie gerade zum Erscheinungsbilde des postencephalitischen Parkinsonismus gehört. Es würde sich daher nicht um eine pathologische Parese der Kaumuskulatur handeln, vielleicht genügt auch schon die normal zeitweise eintretende Erschlaffung der Kaumuskulatur hierfür. Daß bei der geringsten Tonusabnahme der Kaumuskulatur der Unterkiefer gleich mit einer Abwärtsbewegung antwortet, sieht man sehr deutlich im Schlaf, z. B. bei Individuen, welche stehend oder sitzend einschlafen. In der Eisenbahn kann man z. B. beobachten, daß in dem Moment, wo der Sitzende einschläft und damit eine allgemeine Tonusverminderung eintritt, der Mund durch schnelles Herabfallen des Unterkiefers geöffnet wird.

Es ist bekannt, daß bei Encephalitis, besonders bei den Formen, die mit Hyperkinesen einhergehen, eine allgemeine Tonusverminderung, sogen. Hypotonie, vorkommt, aber auch bei den amyostatischen Formen wechseln Perioden von Hypertonie mit solchen von Hypotonie. Eine sehr häufige Erscheinung bei Encephalitis epidemica ist die abnorme Ermüdbarkeit der Muskeln. **Wechsberg** beschreibt Fälle, bei denen infolge der großen Ermüdbarkeit und des Mangels an Antrieb der Kaumuskulatur der Kauakt noch nach zweidreimaligen Kaubewegungen aussehte.

Da an den Masseteren und Temporalis der Unterkiefer mit der ganzen Muskelmasse des Zungenbeins anhängt, so genügt schon eine geringe Tonusabnahme der Kaumuskulatur, um den Unterkiefer sofort nach unten fallen zu lassen. Die Zungbeinmuskulatur allein aber kann bei normal innervierten Kaumuskeln niemals das Uebergewicht gewinnen, dazu ist sie zu schwach.

Das krampfartige Weitaufreißen des Mundes wird in diesem Falle infolge der gleichzeitigen Kontraktion der oberen Zungbeinmuskeln besonders befördert und unterstützt (Paradoxe Kontraktur).

Es ist bekannt, daß die Muskeln bei Encephalitis zwei Erscheinungen darbieten, die bei gesunden Menschen fast vollständig fehlen.

Erstens ist die krankhaft erhöhte Dehnungserregbarkeit der Muskeln bemerkenswert, d. h. ein Muskel, der passiv gedehnt wird, antwortet auf diese Dehnung mit einer Zusammenziehung, der Tonus des gedehnten Muskels steigt an, er fühlt sich straff und hart an. Diese erhöhte Dehnungserregbarkeit tritt ebenso bei langsamer passiver Dehnung auf, jedoch ist der Kontraktionschwulst bei rascherer größer als bei langsamerer Dehnung. „Das plöglliche Unterbrechen der jähen und kurzen ruckartigen Dehnung läßt die Kontraktion des gedehnten Muskels die Form einer chronischen Zuckung annehmen“ (**Mayer** und **John**).

Bei Erkrankung der Pyramidenbahnen hat man ebenfalls eine reflektorische Anspannung des passiv gedehnten Muskels, die aber stets mit einer Steigerung der Sehnenreflexe und mit dem Auftreten von pathologischen Reflexen, wie Babinski usw. einhergeht, was keineswegs zu dem Bilde der Encephalitis gehört.

Die erhöhte Dehnungserregbarkeit der Muskeln wurde zuerst von **Zingerle**, **Mayer** und **John** bei Paralysis agitans beobachtet. Später konnte **Felix Stern** auch bei Encephalitis epidemica dasselbe Phänomen feststellen. Er hat bei Encephalitikern mit Hypertonie bei Extension des Armes eine Anspannung des M. Biceps und Brachioradialis hervorrufen können.

Die zweite Erscheinung, welche auch zuerst bei Paralysis agitans beobachtet worden ist, ist die sogen. „Paradoxe Kontraktur“ nach **Westphahl**, die darin besteht, daß bei Annäherung der Insertionspunkte eines Muskels derselbe mit einer Kontraktion antwortet. Die von **Westphahl** beschriebene Paradoxe Kontraktur konnte er vor allem in der Streckmuskulatur von Fuß u. Zehen, aber auch in den Beugern des Unterschenkels hervorrufen. **Mayer** und **John** haben bei äußerster Dorsalflexion des Fußes eine deutliche Anspannung des M. Tibialis anticus beobachtet.

Nach **Foerster** kann man diese Paradoxe Kontraktur als eine auch bei Arteriosklerose häufig vorkommende Begleitererscheinung betrachten. Nach seiner Meinung ist schon die bloße Annäherung der Insertionspunkte des Muskels von einer gewissermaßen aktiven Anspannung gefolgt, die mit der Dauer der Annäherung immer mehr anwächst. Daher zeigen die Muskeln, deren Insertionspunkte dauernd aneinandergenähert sind, einen erheblichen Kontraktionsgrad. Wenn man den Fuß 1 bis 2 Minuten in passiver Dorsalflexion fixiert hält und nun versucht, ihn wieder plantarwärts zu beugen, so ist der Widerstand der Dorsalflexoren bedeutend größer als zuvor. Mit dieser Neigung der Muskeln durch Annähe-

rung ihrer Insertionspunkte in unwillkürliche Kontraktion zu geraten, hängt es, wie **Foerster** darlegt, auch zusammen, daß eine passiv erhobene Gliedmasse nach Entziehung der Stütze in der von ihm eingenommenen Stellung eine ganze Weile verharret, um erst allmählich zu sinken.

Natürlicherweise ist die Paradoxe Kontraktur auch bei Encephalitis gesucht und gefunden worden, und zwar war es wieder **Felix Stern**, der danach fahndete. Es waren wieder Fälle mit starker Hypertonie, die sich zu dem Versuch eigneten. Der starken Dorsalflexion der Hand folgte eine starke Nachkontraktion der Handextensoren.

Dieselbe Paradoxe Kontraktion könnte auch in unserem Fall den Krampf der Kieferöffner erklären: In dem Moment, wo der Unterkiefer infolge eines Nachlassens der Kaumuskulatur seiner Schwere nach, nach unten fällt, nähern sich die Insertionspunkte der oberen Zungenbeinmuskeln (Vorderer Bauch des Digastrikus, M. Mylohyoideus, Geniohyoideus, Hyoglossus usw.), die sofort in Kontraktion geraten, deren Grad mit der Dauer der Annäherung der Insertionspunkte ansteigt. Daher der große Widerstand, den man bei Versuchen, den Unterkiefer nach oben zu schieben, fühlt. Zu der Paradoxen Kontraktur gesellt sich noch eine feinschlägige Zuckung des Unterkiefers als Folge der plötzlichen starken Dehnung der Kaumuskeln. Natürlich sind auch andere Momente, wie abnorme Ermüdbarkeit, Mangel an Impuls, mangelhafte Innervation, primärer Krampf der Unterkieferöffner, in Betracht zu ziehen. Man könnte sich z. B. den verhältnismäßig wenig beeinträchtigten Kauakt damit erklären, daß während des Kauens die Kaumuskeln besser innerviert werden als sonst bei Ruhe. Während des Kauens werden die Kaumuskeln aktiv innerviert. Im Ruhezustand dagegen fällt die aktive Innervation weg, die Muskulatur behält nur ihren Tonus. Ob auch die Zunge krampfhaft herausgestreckt wird, läßt sich schwer bestimmen, jedoch ist es sehr leicht möglich, daß das Herausstrecken durch Kontraktion des M. Genioglossus erfolgt, der beim Weitaufreißen des Mundes stark gedehnt wird und sich sofort kontrahiert.

Ich möchte anschließend auf einen Fall aus der Literatur hinweisen, der nosologisch unserem sehr ähnlich ist aber ganz anderer Ätiologie.

„Eine 56 jährige reizbare Frau hatte sich ein vorderen Backzahn links unten ausziehen lassen und danach heftige Schmerzen in der Massetergegend bekommen. Als diese nachließen, traten starke Spasmen ein, durch welche der Unterkiefer heftig nach links und hinten (mit

mehrmaliger Luxation) und die Zunge weit aus dem Munde herausgestoßen wurde. Man mußte sich entschließen, instrumentell den Unterkiefer gegen den Oberkiefer aufgepreßt zu halten. Aber bei Entfernung des Instrumentes zeigte sich sofort der Krampf" (Bericht von **Ch. Féré** auf der „Société de Biologie“ in Paris im Jahre 1887).

Außer dem Krampf der Unterkieferöffner bietet unsere Patientin noch andere Störungen, wie z. B. Facialisparese, Auswärtsstellen des linken Beines beim Gehen, Tremor der oberen Extremitäten usw., Erscheinungen, die man sonst bei Encephalitis epidemica oft sieht.

Nach **Felix Stern** stehen bei E.e. hinsichtlich ihrer Häufigkeit die Lähmungen und Paresen der Facialis an erster Stelle. Besonders oft kommt die Facialisparese bei denjenigen Formen von Encephalitis vor, die unter dem Namen Pseudobulbärparalyse bekannt sind (bei dieser handelt es sich um encephalitische Prozesse in den Verbindungen zwischen Hirnrinde und den Kernen der Hirnnerven). Die Pseudobulbärparalyse kann sich je nach der Lokalisation der Herde mit Bewegungsstörungen der Extremitäten von amyostatischem Charakter verbinden.

Gelegentlich kommen Facialisstörungen auch bei der Polioencephalitis inferior (akute entzündliche Bulbärparalyse) vor. Neben einer entzündlichen Läsion der Kerne des Glossopharyngeus, Vagus, Accessorius und Hypoglossus, kommt es auch zu einer Kernläsion des Facialis.

Das Auswärtsichleudern des linken Beines könnte man erstens als eine Art choreatische Bewegung von großer Amplitude ansehen.

Diese Bewegung besteht darin, daß die Patientin, bevor sie den Fuß auf den Boden setzt, einige grobschlägige Wackelbewegungen mit dem Bein macht. Diese Bewegungen sind besonders deutlich beim plötzlichen Umkehren.

Die choreatischen Bewegungen mit großer Amplitude und langsamem Verlauf sind charakteristisch für die Postencephalitis. Sie sind sehr oft begleitet von amyostatischen Erscheinungen und Hypertonie. Solche rhythmischen langsamen choreoastischen Bewegungen im chronischen Stadium der Encephalitis sind von **Leibbrand, Mayer u. Krambach, Stern** usw. beschrieben worden.

In diesem Sinne wäre auch die von **Marie und Lewy** beschriebene „Chorée salutante“ zu verwerfen, die darin besteht, daß sich beim Stehen der Oberschenkel am Becken beugt, der Tibialis anticus sich kontrahierte, der Rumpf gebeugt, die Schulter gesenkt, die Finger der rechten Hand extendiert und gespreizt werden, während sich die Zehen links alternierend extendierten und beug-

ten und der Kopf nach links hinten geneigt wurde. Alle Bewegungen sind ziemlich langsam, können vorübergehend unterdrückt werden, hören im Liegen auf und kehren beim Sprechen wieder. (**F. Stern**, die epidemische Encephalitis Monographie 1922 S. 54).

Zweitens könnte das Auswärtschleudern des linken Beins beim Gehen dadurch zustande kommen, daß eine Störung der Gleichgewichtsverhältnisse zwischen Agonisten und Antagonisten vorhanden ist, was ja eines der Grundsymptome des bei Encephalitis vorhandenen amyotatischen Symptomenkomplexes bildet.

Alle diese Symptome, außerdem das Salbengesicht, die starke Hyperhydrosis und die Andeutung an Parkinsonismus machen den encephalitischen Ursprung des ganzen Krankheitsbildes wahrscheinlich.

Eine Läsion in den motorischen Kernen des Trigeminus und Hypoglossus ist nicht anzunehmen, da alle üblichen Begleitererscheinungen fehlen, vor allem die ausgebildete Lähmung usw. Befallen sind aber hier die basalen Hirnganglien. Pathologisch-anatomisch findet man bei an Encephalitis acuta Gestorbenen die Gehirne hyperämisch und geschwellt. Mikroskopisch sieht man an der Adventitia der kleinen Gefäße Infiltrationen, die diese mantelartig umgeben. Die Infiltrationen bestehen hauptsächlich aus Lymphozyten, zum Teil aus Plasmazellen. Leukozyten sind selten gefunden worden. Die Gefäßwände selbst zeigen wenig Veränderungen. Man findet manchmal die Endothelien gequollen. An der Hirnsubstanz werden die Ganglienzellen besonders betroffen. Verschiedene Degenerationsformen der Ganglienzellen werden beobachtet: Schrumpfung, pyknotischer Zerfall, blasige Aufhellung der Kerne oder Aufquellung des Protoplasmas. Um diese zerfallenen Ganglienzellen findet man eine reparatorische Gliawucherung und Fettkörnchenzellen. Nekrosen der Ganglienzellen sieht man besonders oft im Verlauf der entzündeten Gefäße. Nach Berichten verschiedener Autoren sind die entzündlichen Veränderungen bei Postencephalitis sehr spärlich. Im Vordergrund stehen vielmehr die von Gefäßveränderungen unabhängigen Parenchymdegenerationen.

Was die Ursache dieser fortschreitenden degenerativen Veränderungen ist, weiß man noch nicht. Vielleicht spielen auch hier, wie **Hauptmann** für die Metaleus angenommen hat, außer der lokalen Erregerwirkung noch toxische Momente mit. Interessant ist jedenfalls die Parallele beider Prozesse in Bezug auf eine Meta-Entstehung.

Die weiße Substanz wird weniger und seltener befallen, als die graue. Prädispositionsstellen für diese patho-

logischen Folgen bei der E. c. sind das Höhlengrau des dritten und vierten Ventrikels, die subkortikalen Stammganglien: Thalamus, Hypothalamus, Vierhügel, Nucleus Ruber und vor allem Nucleus Lentiformis, Caudatus und Substantia nigra.

Ueber die Physiologie und Funktion der subkortikalen Stammganglien wurde zuerst von Anton im Jahre 1894 berichtet. Anton sah in den Stammganglien mehr als eine Durchgangsstation für periphere und zentrale Reize. Er schrieb dem Thalamus die Rolle eines Zentrums für Bewegungsanregungen zu und zwar die automatischen hauptsächlich aber der Ausdrucksbewegungen.

Der Linsenkern, speziell das Putamen, stellt nach seiner Anschauung ein hemmendes Zentrum für den Thalamus dar. Bei Linsenerkrankungen fällt der hemmende Einfluß weg und die Bewegungsimpulse des Thalamus treten, angeregt durch die erhaltenen zentripetalen Reize, in verstärkter excessiver Weise hervor. Diese ungehemmten Bewegungsimpulse gelangen durch die motorische Hauptbahn zur Peripherie.

Mit der Theorie von **Anton** über die Funktion der Stammganglien decken sich im wesentlichen die im Jahre 1920 von **C. und O. Vogt** dargelegten Anschauungen. Auch sie betrachten das pallidofriäre System als ein wichtiges, für sich selbstverständliches Zentrum und je nach der Lokalisation des Krankheitsprozesses und nach dem Grade der Störung resultieren die verschiedenen Hyper- und Hypokinesen. Das Corpus Striatum übt eine regelnde Wirkung auf das Pallidum aus. Chorea, Athetose, Tremor, Zwangslachen und Zwangsweinen fassen **C. u. O. Vogt** als die Enthemmung des Pallidum vom Striatum auf. Seinerseits hat das Pallidum eine regelnde Wirkung auf die subpallidären Zentra, speziell auf das Kleinhirn.

Hypokinesen geringeren Grades, wie Bewegungsarmut, Armut der Mimik und Gestikulation entstehen nach **C. und O. Vogt** durch einseitige Erkrankungen des Pallidum. Beiderseitiger Ausfall des Pallidum ruft Versteifung in den sonderbarsten Stellungen hervor. Diese Versteifungen, diese Hypertonie treten durch den Fortfall der regelnden Wirkung des Pallidum auf das Kleinhirn auf.

Foerster vertritt im allgemeinen die Anschauungen **C. u. O. Vogts**. Die Mitbewegungen kommen nach seiner Ansicht dadurch zustande, daß eine Irradiation des Willenimpulses bereits an einer zentralen Stelle, die mit der Verteilung der kortikalen Impulse betraut ist, stattfindet. Sehr deutlich zeigt sich da die Abhängigkeit der

Intensität und Extensität der Mitinnervationen und Mitbewegungen von der die Willenshandlung begleitenden Affektlage. (**Foerster**: Zur Analyse und Pathophysiologie der striären Bewegungsstörungen. S. 61).

Speziell für die Kau- und Schluckbewegungen nimmt **Vogt** ein Hemmungszentrum im Nucleus Caudatus und im Putamen an. **Wilson** bestätigt diese Annahmen durch Beobachtungen bei der Lentikulardegeneration. Es können aber auch die Linsenkernaffektionen durch eine Läsion benachbarter Faserzüge oder zentripetaler Reflexbahnen des Linsenkernareals erklärt werden (**Oppenheim**).

Auch die krankhaft erhöhte Ansprechbarkeit der Muskulatur auf Dehnung wird als Wegfall bestimmter normalerweise hemmender nervöser Impulse auf die Subkortikal-Apparate bezogen.

In unserem Fall müssen wir angesichts aller Symptome, die zweifellos für eine Encephalitis sprechen, eine Läsion des Globus Pallidus und der Substantia nigra annehmen. Es können aber, wie **Oppenheim** hervorgehoben hat, die Faserzüge von einem Kern zum anderen erkrankt sein. Andererseits spricht der Unterkieferkrampf für eine Affektion auch des Corpus striatum. Denn eine isolierte, wenn auch sehr intensive Erkrankung des Globus Pallidus bringt keine Hyperkinesen außer Tremor zustande.

Die hochgradige Hyperhidrosis, das Salbengesicht, als Ausdruck der gesteigerten Funktion der Talg- und Schweißdrüsen und der übermäßige Speichelfluß werden durch eine Affektion des vegetativen Zentrums im Zwischenhirn hervorgerufen.

Der Unterkieferkrampf unserer Patientin hat unverkennbar große Ähnlichkeit mit dem Vorgang des Gähnens und der Gähnkrämpfe. Das Sonderbare ist, daß während des häufigen krampfartigen Weitaufreißens des Mundes die Patientin keineswegs das Gefühl des Gähnens hat. Die Frage, ob der Krampf irgendwie mit dem Gähnen und dem Gähnkrampf im Zusammenhang steht, ist von besonderem Interesse, weil ja das Gähnen bei Encephalitis epidemica so oft vorkommt, ohne das bis jetzt eine Erklärung des Zusammenhangs des Gähnens mit Encephalitis gegeben worden wäre.

Die Berichte in der Literatur über das Gähnen überhaupt sind sehr dürftig. Die Physiologen betrachten das Gähnen als eine Abart der Atmung und als Begleiterscheinung bei verschiedenen Gehirnerkrankungen. **Bing** betrachtet das Gähnen als eine Teilererscheinung von Tic facial.

Abderhalden beschreibt den Gähnakt folgendermaßen: Bei diesem wird sehr tief und ausgiebig alpiriert,

wobei die Stimmbänder in Schwingung versetzt werden können. Es kommt dann zur Stimmgähnung. Das Gähnen stellt einen sehr komplizierten Vorgang dar (**Mayer**). Es tritt spontan ein, kann jedoch auch durch bestimmte Vorstellungen beeinflusst werden (Unterdrückung des Gähnaktcs). Es erfolgt zuerst eine inspiratorische Erweiterung des Thorax. Das Zwerchfell tritt tiefer, auch der Kehlkopf ist gesenkt. Das Gaumensegel wird gehoben, die Zunge nach rückwärts bewegt und die Stimmritze weit geöffnet. Auf dem Höhepunkt des Gähnaktcs wird tiefster Inspirationsstand erreicht. Der Unterkiefer wird soweit als nur möglich gesenkt, vielfach kommt es zugleich zu tonischen Kontraktionen in verschiedenen Muskelgebieten des Skeletts. Anschließend folgt dann eine kurze Expiration, und anschließend ein Schluckakt. Häufig tritt Abgabe von Tränen auf.

Es ist heute nicht möglich, etwas über die Bedeutung des Gähnens auszusagen. Das spontane Gähnen hängt in irgend einer Weise mit dem Schlafbedürfnis zusammen. Es ist übrigens geglückt, nahe des Calamus skriptorius ein Gähnzentrum festzustellen (**Abderhalden**, Lehrbuch der Physiologie 2. Teil S. 408 1925).

Im Jahre 1920 ist ein Referat über einen Vortrag von **Hauptmann** über das Gähnen im Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten Bd. 62 erschienen.

Hauptmann interessiert das Gähnen vom Standpunkt der Langeweile. Interessant ist seine Beschreibung des Gähnvorganges, die wir später bei anderen Autoren immer wieder treffen. „Gähnen ist ein auf Brustkorb, Pharynx, Larynx, Gesicht reduziertes Recken, bei dem Agonisten und Antagonisten angespannt werden, wodurch dem Erschlaffungszustand der Muskulatur in erhöhtem Maße entgegengewirkt werden kann.“ Er gibt dem Gähnen die Bedeutung einer Gegenreaktion gegen gezwungene Untätigkeit des Gehirns. Auf die Frage **Hauptmanns**: „Wie, wann und wozu gähnen wir“ sind später einige Arbeiten erschienen, diese sind im wesentlichen mit der Anschauung **Hauptmanns** deckend.

Durch das Gähnen, d. h. beim Recken und Strecken, aller Glieder tritt reflektorisch eine Umlagerung des Blutes aus dem venösen in den arteriellen Kreislauf und damit eine bessere Durchblutung des ganzen Körpers, besonders des Gehirns auf. Im allgemeinen bedingt die Gehirnanämie das Zustandekommen des Gähnaktcs (**V. Dampert**).

Ernst Lewy betrachtet das Gähnen als einen sehr komplizierten automatischen Vorgang, den man gemeinsam mit dem Sichrecken auch im Tierreich bis zu den Amphibien und Vögeln verfolgen kann. Das „Sichrecken“

spielt bei dem Gähnen eine große Rolle, indem der Körper dem allgemein herabgesetzten Muskeltonus entgegentritt z. B. wird das Gähnen besonders häufig nach dem Schlaf beobachtet, wo das Bedürfnis des Organismus nach Erhöhung des Tonus besonders groß ist. Nach Lewys Ansichten kommt das Gähnen physiologischerweise bei Ermüdungszuständen vor dem Schlaf, nach dem Erwachen, bei Hunger und pathologisch als Begleiterscheinung vieler organischen und funktionellen Gehirnerkrankungen vor. (Apoplexie, Epilepsie, Läsion des Kleinhirnes, Anämien, Zirkulationsstörungen des Gehirns usw.) Das Gähnzentrum will **Lewy** im Anschluß an einen von **O. Fischer** mitgeteilten Fall von Encephalitis, bei dem nach anfänglichen Reizerscheinungen zusammen mit noch anderen Automatismen später das Gähnen verloren ging, mit dem Corpus striatum in Zusammenhang bringen.

Eine eingehende Beschreibung der einzelnen Phasen des Gähnaktes gibt uns **C. Mayer** in „Physiologisches und Pathologisches über das Gähnen“.

Er teilt das Gähnen in 3 Phasen ein.

1. Initialphase. Der Thorax nimmt die tiefe Inspirationsstellung ein, subjektiv fühlt man Knacken im Ohr.
2. Die zweite Phase-Akme des Gähnens, Erweiterung des Thorax zu äußerstem Inspirationsmaß, Verharren des Kehlkopfes und wahrscheinlich des Diaphragma im Tiefstand. Der Abstieg des Unterkiefers steigert sich tonisch zum äußersten möglichen Ausmaß unter Prallwerden des Mundhöhlenbodens. Zunahme der Bewegung der Zunge nach rückwärts, der Hebung des weichen Gaumens. Tonische Kontraktionen einer individuell verschiedenen Zahl von Muskeln im Hals, Schulter und Stammbereich, Subjektiv Schwirren in den Ohren, Gefühl einer gewissen Befriedigung oder Erleichterung, das sich auch in die nächste Phase fortsetzt.
3. Die dritte Phase: Kurze Expiration, Aufsteigen von Unterkiefer und Kehlkopf, Entspannung der in der Akme kontrahiert gewesenen Muskeln (eventuell Breitziehen des Mundes, Lidßchluß).

Die während der Akme in Erscheinung tretenden tonischen Muskelkontraktionen will **Mayer** als eine Mitwirkung der Hals- und Schultergürtel, durch ein Irradieren des inspiratorischen Innervationsimpulses in Muskeln, die als Hilfsmuskeln in Betracht kommen, ansehen. Der Abstieg des Unterkiefers dagegen ist nach **Ficks** Meinung auf eine Kontraktion der oberen Zungenmuskulatur zurückzuführen.

Nun konnte Mayer in vier Fällen von Encephalitis einen abnormen Verlauf des Gähnaktes feststellen. Bei einem jungen Knaben kam es zu weitem Aufreißen des Mundes wie beim Gähnen, und gleich daran schloß sich eine kleine Inspiration und Expiration, eine sehr kurze Dauer der Akme. Bei den anderen 3 Fällen kam es nur teilweise zu Weitöffnen des Mundes. Die Patienten hatten das Bedürfnis zu Gähnen, aber die Unmöglichkeit sich auszugähnen bereitete ihnen große Unlustgefühle.

Das Gähnen steht nach **Mayers** Ansicht im Zusammenhang mit dem Schlafen und tritt besonders oft bei Schlafbedürfnis auf. Ein Zentrum für das Gähnen würde höchstwahrscheinlich in dem subkortikalen Gebiet zu suchen sein.

Mayers Beschreibung des Gähnens ist für uns insofern von Interesse, als wir bei unserer Patientin rein nach der Form des krampfartigen Aufreißen des Mundes eine Art Gähnkrampf annehmen könnten, wobei die Akme ins Unendliche verlängert wird und im Gegensatz zu **Mayers** Fällen die Patientin während des Krampfes keineswegs das Gefühl des Gähnens hat.

Zu erwähnen wären noch die Gähnkrämpfe bei den Hysterischen. Funktionell gehören die Gähnkrämpfe zu dem lokalisierten Muskelkrampf, kommen bei Epilepsie, Kleinhirntumoren, Hirnakzessen vor, aber ungemein häufig bei Nervösen und Hysterischen. Bei Neuropathen führt das Ueberhungern besonders gern zu krampfhaftem Gähnen. (**Mohr u. Stähelin**, Handbuch der inneren Medizin.)

Bei Hysterischen kann sich das physiologische Gähnen bei Ermüdung zu Gähnkrämpfen steigern.

An Hand der Tatfache, wie leicht der Unterkiefer ein krampfhaftes Gähnen vortäuschen kann, ist die Überlegung naheliegend, ob nicht manche der in der alten Literatur beschriebenen Fälle hysterischer Gähnkrämpfe in Wirklichkeit nur ein krampfhaftes Aufreißen des Mundes auf Grund einer encephalitischen Affektion waren, die früher wegen des noch unbekannten Bildes der Späencephalitis als solche nicht diagnostiziert worden sind.

Herrn **Professor Dr. Hauptmann**

für seine gütige Unterstützung verbindlichsten Dank.



Literatur.

- Abderhalden:** Lehrbuch der Physiologie 2. Teil Urban und Schwarzenberg 1925.
- Anton C:** Ueber die Beteiligung der großen basalen Gehirnganglien bei Bewegungsstörungen, insbesondere bei der Chorea, Jahrbuch für Psychiatrie. Bd. 14 V. H. I.
- Bing:** Lehrbuch der Nervenkrankh. 1913 Verl. Urban u. Schwarzenberg.
- Dumpert V:** Wesen und physiologische Bedeutung des Gähnens. Journal Psych. und Neur. Bd. G. 27 H. 1 und 2 1922.
- Féré Ch.:** Ueber einen Fall von Krämpfen des von N. Hypoglossus innervierten Muskeln. Société de Biologie de Paris. Sitzung vom 23. April 1887. Neur. Zbl. Heft 120.
- Fick:** Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke Jena 1911.
- Foerster O.:** Die Kontrakturen bei den Erkrankungen der Pyramidenbahn. Karger, Berlin 1906.
- „ Die arteriosklerotische Muskelfarre. Allg. Zeitsch. f. Psych. 66. 1909.
- „ Zur Analyse und Pathophysiologie der Striären Bewegungsstörungen. Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. Bd. 7. 73 H. 1-3 1921.
- Geigel D.:** Das Gähnen. M. M. W. 1908.
- Hauptmann:** Wie, wann und wozu gähnen wir? Archiv f. Psych. und Nervenkr. Bd. 62. 1921.
- Hört L.:** Zur Lokalisation des kortikalen Kaumuskelzentrum beim Menschen. Klin. Woche 1887. H. 27.
- Fürbringer:** Die symptomatische Bedeutung des Gähnens Zeitschr. f. ärztl. Fortbildung Jg 22, N. 16, 1925.
- Lewandowsky:** Handb. f. Neurologie 1914. Verl. Jul. Springer Bd. 3, 4, 5.
- Lewy E.:** Ueber d. Gähnen. Zeitsch. f. d. ges. Neur. u. Psych. Bd. 72. 1921.
- Luckhoff A.:** Anatomische Untersuchungen encephalitischer Spätschaden. Zentrbl. f. d. ges. Neur. und Psych. Bd. 37 Verein deutsch. Aerzte, Prag, Sitz vom 11. 1. 1924.
- Marie P. u. Lewy G.:** Le Syndrom exitomoteur de L'encephalite epid. Rev. Neurol. 1920.
- Mayer C.:** Physiologisches und Pathologisches über das Gähnen. Zeitschr. f. Biolog. Bd. 73 neue Folg. 55 1921.
- Mayer C. u. John:** Zur Symptomatologie des Parkinsonschen Formenkreises usw. Zeitschr. f. d. ges. Neur. u. Psych. 65, 62.
- Mohr u. Stähelin.:** Handbuch der inneren Medizin 1909. 12. Verlag J. Springer. Bd. 5.
- Nonne:** Zum Kapitel der epidemisch auftret. Bulbärmyelitis u. Encephalitis. Deutsch. Zeitschrift für Nervkr. 64. H. 1. 1919.
- Oppenheim:** Lehrbuch d. Nervenkrankheiten Bd. 1. Ver. S. Krager 1913.
- Pette:** Die epid. Encephalitis in ihren Folgezuständen. Deutsche Zeitschr. f. Nervkr. 76. 1923.
- Popowa Nima:** Tonische Krämpfe der Augenmuskulatur bei Enceph. epid. Zeitsch. f. d. ges. Neur. u. Psych. Bd. 97.
- Rauber-Kopsch:** Lehrbuch d. Anatomie Bd. 3 11. Aufl. Verl. Georg Thieme.
- Richard Cords:** Die Augensymptome bei der Encephalitis lethargica. M. M. W. 1920.
- Rosenthal Landois:** Lehrbuch der Physiologie des Menschen. 18. Aufl. Verl. Urban und Schwarzenberg 1923.
- Sainton:** Press. med. 1918. 53.
- Stern Felix:** Die epidemische Encephalitis Monographie. 1920.
- Strümpel:** Ueber Encephalitis epid. D. M. W. 1920.
- Vogt C. u. O.:** Zur Lehre der Erkrankungen des striären Systems. Journ. f. Psych. und Neur. Bd. 25 H. 1.
- Westphal:** Ueber eine Art paradoxe Muskelkontr. Arch. f. Psych. 1870.
- Wexberg:** Ueber Kau- und Schluckstörungen. Zeitsch. f. d. ges. Neur. und Psych. Bd. 71.
- Zingerle:** Beitrag zur Kenntnis des extrapyramidalen Symptomenkomplexes. Journal f. Psych. und Neur.

Lebenslauf.

Ich bin am 28. Juli 1901 in Stara-Zagora (Bulgarien) geboren. Im Juni 1918 absolvierte ich die pädagogische Schule in Stara-Zagora. Im Jahre 1921 und 1922 habe ich die Ergänzungsprüfungen bestanden. Im Dezember 1922 wurde ich als Gasthörerin in der medizinischen Fakultät der Universität Halle aufgenommen, und im Mai 1923 wurde ich als ordentliche Studierende immatrikuliert. Ich studierte ununterbrochen in Halle a. S. 10 Semester Medizin. Die ärztliche Vorprüfung habe ich im Jahre 1925 in Halle a. S. bestanden. Während meiner Studienzeit in Halle a. S. habe ich die Vorlesungen folgender Professoren und Dozenten gehört:

Abderhalden, Bennecke, Clausen, Grund, Göbel,
Gruven, Denker, Eisler, Höcker, Hett, Hauptmann,
Karsten, Mie, Nürnberger, Stieve, Völker, Volhard,
Vorländer, Wertheimer, Wesel.

